

S. 70543
94
Ent.

NACHRICHTENBLATT

DER BAYERISCHEN ENTOMOLOGEN

NachrBl. bayer. Ent. 37 (3)

1. Oktober 1988

ISSN 0027-7425

Inhalt: G. GEISS: Die Bockkäfer des Bayerischen Waldes (Coleoptera, Cerambycidae). S. 65. – R. GRIMM: Zur Eintagsfliegenfauna der Donauzuflüsse Rot und Rauglen (Baden-Württemberg) (Insecta, Ephemeroptera) S. 73. – H. MENDEL: Weitere Limoniiden aus Jugoslawien (Diptera, Nematocera, Limoniidae) S. 84. – K. SPORNRAFT: Eine neue südafrikanische *Ithya*-Art (Coleoptera, Nitidulidae) S. 86. – G. SEITZ: Beitrag zur Kriebelmückenfauna Niederbayerns (Insecta, Diptera, Simuliidae) S. 89. – Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft: Programm für Oktober bis Dezember 1988 S. 95.

Die Bockkäfer des Bayerischen Waldes

(Coleoptera, Cerambycidae)

Von Günther GEISS

Abstract

Collecting records of the Long-horned beetles of the "Bayerischer Wald" (East Bavaria) since 1952 are listed and compared with those of the years 1873–1884 and 1906.


Da meines Wissens keine neueren Veröffentlichungen über die Cerambyciden des Bayer. Waldes existieren, war es mir ein Bedürfnis, meine langjährigen Sammelergebnisse aufzuzeigen. Besonders bedanken möchte ich mich bei folgenden Personen, die mir Einsicht in ihre Sammlungen erlaubten oder die Daten übermittelten:

Fridolin APFELBACHER, Spiegelau (A); Manfred DÖBERL, Abensberg (D); Günther GEISS, Spiegelau (G); Heinz HABERDA, Deggendorf (HA); Dr. Franz HEBAUER, Deggendorf (HE); Leo und Konrad LACKERBECK, Zwiesel (LA); Lilly WACHNITZ, Grafenau (W), deren Sammlung im Besitz der Nationalparkverwaltung ist.

Die Abkürzungen der Namen werden in der nachfolgenden Auflistung verwendet. Die Arten wurden, wenn nicht besonders erwähnt, vom Finder determiniert und befinden sich in dessen Sammlung.

Das besammelte Gebiet umfaßt den „Mittleren und Unteren Bayer. Wald“, dessen Abgrenzungen auf der Karte ausgewiesen sind.

Die Biotope sind sehr mannigfaltig: Auwälder und Feuchtwiesen entlang der Bäche und Flüsse, sowie xerotherme Hänge bei Jochenstein. Der Bergzug entlang der tschechischen Grenze mit seinen Erhebungen bis 1456 m hat montanen Charakter.



Von den etwa 250 in der mitteleuropäischen Fauna vorkommenden Arten konnten 91 in dem von mir besammelten Gebiet nachgewiesen werden. Der Vollständigkeit halber wurden auch die Funde von KITTEL (1873–1884) und THIEM (1906) mit aufgeführt. Die Nummern bei den Funddaten bezeichnen die Planquadrate auf der Generalkarte (Abb. 1).

Die Nomenklatur richtet sich nach FREUDE, HARDE, LOHSE (1966) „Die Käfer Mitteleuropas“.

Artenliste

Ergates faber (L.)

Deggenu/Deggendorf (21) 1 Ex. am 8. 1968 an der Hauswand HA / Passau (37) KITTEL 1883

Prionus coriarius (L.)

Spiegelau (17/18) von August–September 1973–80 immer nur vereinzelt am Boden kriechend, G u. A / Umg. Deggendorf und Lalling (15 u. 16) am 7. 1953 u. am 8. 1956 W / Grafenau (18) am




Abb. 1: Auszug aus der Mars-Generalkarte 1984/86 1:400 000
Mittlerer und Unterer Bayerischer Wald

9. 1954 W / Schöllnach (22) am 9. 1957, Einzelfund, W / Deggendorf (21) am 8. 1968 HA Einzelfund / Frauenau (11) am 10. 1968, Umg. Gr. Falkenstein (5) am 8. 1969, Einzelfunde, LA / Rusel (15) am 7. 1977 D Einzelfund

Spondylis buprestoides (L.)

Spiegelau (18) am 8. 1974 am Spätnachmittag in Anzahl zugeflogen G / Deggendorf (15) am 8. 1961 u. 9. 1968 W / Frauenau (11) am 8. 1970 u. Gr. Falkenstein (5) 8. 1970 LA / Oberfrauenau (11) am 8. 1987 mehrere Exemplare an frischen Holzklaftern, G u. A

Criocephalus rusticus (L.)

Spiegelau (18) am 8. 1975 1 Ex. im Fluge, G / Jochenstein (42) am 9. 1982 mehrere Ex. unter der dicken Rinde einer liegenden Kiefer, G u. A / Umg. Freyung (25) 9. 1968, W / Ranfels (23) am 8. 1983 A / Auerbach (21) 9. 1970 HA / Frauenau (11) am 7. 1968 und Gr. Falkenstein (6) 9. 1968 LA

Asemum striatum (L.)

Frauenau (11) am 6. 1952 W Einzelfund / Zwiesler Waldhaus (5) 6. u. 7. 1981, LA Einzelfunde

Tetropium castaneum (L.)

Häufige Art, überall vorkommend

Tetropium fuscum (F.)

Rachel (12) am 8. 1984 3 Ex. unter der Rinde von toten Fichten A / Arber (5) ein Einzelfund am 7. 1984 LA

Rhagium bifasciatum F.

Im ganzen Gebiet nachgewiesen, häufig in den Wurzelpartien von Fichtenstöcken.

Rhagium sycophanta (SCHR.)

Frauenau (18) 5. 1953 / Grafenau (18) 5. 1958 / Waldhäuser (12) 6. 1969 alles Einzelfunde W

Rhagium mordax (DEG.)

Im ganzen Gebiet

Rhagium inquisitor (L.)

Häufige Art, überall nachgewiesen

Toxotus cursor (L.)

Spiegelau (18) Einzelfunde am 5. 1977 u. 6. 1976 G / Frauenau (11) am 6. 1968 u. Gr. Falkenstein (6) 6. 1970 LA / Waldhäuser (12) 6. 1952, Regen (10) 7. 1952, Lohberg (2) 7. 1956, Grafenau (18) 5. 1962, Umg. Deggendorf (15) 5. 1967 Einzelfunde W / Greising bei Deggendorf (15) 8. 1968 D

Stenocorus meridianus (L.)

Deggendorf (15) 6. 1969 Einzelfund HA

Pachyta quadrimaculata (L.)

Umg. Spiegelau (18) in einer Waldschneise von Juni – Juli jedes Jahr regelmäßig in Einzelstücken auf Dolden zu finden G u. A / Grafenau (18) 5. 1964 u. 6. 1969 Einzelfunde W / Frauenau (11), Gr. Falkenstein (6), Zwiesler Waldhaus (5) in den Sommermonaten regelmäßig auf Doldenblüten LA

Pachyta lamed (L.)

Ludwigsthal (6) am 7. 1987 1 Ex. auf einem Holzstoß LA

Evodinus clathratus (F.)

Deggendorf/Dreitannenriegel (15) im Mai 1975 u. 76 HA / Umg. Waldhäuser u. Rachel (12) ca. 800–1000 m, in den Sommermonaten nicht selten auf blühendem Gebüsch und Geißbart G, A, W / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6, 11) in den Sommermonaten auf Blüten und blühenden Stauden LA / Mauth (19) 6. 1986 A

Gaurotes virginea (L.)

Umg. Spiegelau (17, 18) im Sommer häufig auf Blüten G. A, W / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6) im Sommer ebenfalls häufig auf Blüten LA, W / Schönberg (17) 7. 1959, Waldhäuser (12) 7. 1970, Umg. Deggendorf (15) 7. 1971 W / Frauenau (11) im Sommer häufig LA / Mauth (19) 6. 1986 A

Acmeops pratensis (LAICH.)

Passau (37) KITTEL 1883

Acmeops marginata (F.)

Gr. Falkenstein (6) 6.1978 HE Einzelfund

Acmeops collaris (L.)

Jochenstein (42) im Juni u. Juli häufig, besonders auf Dolden G, A / Umg. Passau (37) 5.1961, Hengersberg (21) 6.1961, Wegscheid (40) 6.1972 W / Deggendorf (15) 6.1973 HA / Mauth (19) 6.1986 A

Pidonia lurida (F.)

Umg. Spiegelau (17, 18) im Sommer auf Doldenblüten und Geißbart häufig G, A / Jochenstein (42) im Sommer ebenfalls zum Teil sehr häufig auf Dolden G, A / Waldhäuser (12) 7.1971, Grafenau (18) 7.1971, Wegscheid (40) 7.1970 W / Mauth (19) 6.1986 A / Finsterau (13) 7.1969 D

Cortodera femorata (F.)

Grafenau (18) 5.1953 Einzelfund W

Grammoptera ruficornis (F.)

Im ganzen Gebiet auf Blüten und blühendem Gebüsch, teilweise sehr häufig

Grammoptera variegata (GERM.)

Umg. Deggendorf (15) 6.1970 Einzelfund HA

Alosterna tabacicolor (DEG.)

Überall häufige Art, besonders auf blühendem Gebüsch

Nivellia sanguinosa (GYLL.)

Böbrach bei Auerkiel (21) 7.1971 1 Ex. auf einer Doldenblüte HA, trotz intensiver Suche wurde kein weiteres Stück mehr gefunden

Leptura livida (F.)

Überall häufige Art, auf blühenden Wiesen, auf Blüten an Wald- und Wegrändern

Leptura erythroptera HAGENB.

Grafenau (18) 7.1968 Einzelfund W

Leptura maculicornis DEG.

Umg. Grafenau und Spiegelau (17, 18) von Juni–August häufig, auf Blüten, W, G, A / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6, 11) ebenfalls häufig auf Blüten, W, LA, D / Mauth (19) 6.1986 A / Rusel (15) 7.1970 und Finsterau (13) 7.1969 D

Leptura rubra L.

Im ganzen Gebiet häufige Art

Leptura scutellata F.

Zwieseler Waldhaus (6) von Juni–August regelmäßig aber meist einzeln auf Schirmblüten, D, G, A, LA / Jochenstein (42) 6.1984 mehrere Tiere in alten Eichen und Buchenstöcken, G, A

Leptura sanguinolenta L.

Finsterau (13) 7.1969 D / Waldhäuser (12) 7.1978 G, sowie am 8.1981 A, vereinzelt auf Dolden / Umg. Spiegelau (17, 18) am 8.1978 A, und am 8.1983 G, auf Dolden / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6) von Juli–September nicht selten auf Schirmblüten LA

Leptura dubia SCOP.

Grafenau (18) 7.1976 W / Umg. Spiegelau (17) im Sommer häufig auf Blüten G, A / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6, 11) im Sommer ebenfalls häufig auf Blüten LA, D, G, A / Mauth (19) 6.1986 A

Leptura virens L.

Spiegelau (17) am 7.1973 u. 1983 je ein Einzelfund auf Dolden A / Klingenbrunn (11) 7.1983 Einzelfund LA / Bayer. Eisenstein (2) Schilsky 1900 lt. Horion / Passau (37) Kittel 1983

Judolia sexmaculata (L.)

Grafenau (18) 6. 1972 W / Waldhäuser (12) 6. 1979 A, und am 7. 1983 ein Ex. im Flug gefangen G / Spiegelau (17) 7. 1982 u. 7. 1983 Einzelfunde A / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6, 11) vom Juni–September mehr oder weniger regelmäßig LA

Judolia cerambyciformis (SCHRK.)

Im ganzen Gebiet, stellenweise sehr häufig, auf Blüten

Strangalia revestita (L.)

Untergriesbach (39) am 17. 6. 1986 ein Ex. auf einer Dolde sitzend A

Strangalia pubescens (F.)

Passau (37) KITTEL 1883

Strangalia quadrifasciata (L.)

Im ganzen Gebiet vorkommend, aber meist einzeln auf Blüten

Strangalia maculata (PODA)

Überall auf Blüten und Dolden, stellenweise sehr häufig

Strangalia arcuata (PANZ.)

Erlau (38) 12. 6. 1983 ein Stück auf einer Doldenblüte neben einem Bach LA

Strangalia aethiops (PODA)

Im ganzen Gebiet, meist einzeln auf Blüten

Strangalia melanura (L.)

Überall häufige bis sehr häufige Art

Strangalia bifasciata (MÜLL.)

Grafenau (18) 7. 1972 Einzelfund W / Jochenstein (42) im Sommer nicht selten auf Blüten G, A, LA

Strangalia nigra (L.)

Im ganzen Gebiet vorkommend, auf Blüten u. Dolden, aber meist einzeln

Strangalia septempunctata (F.)

Jochenstein (42) im Juni und Juli an sehr heißen, eng begrenzten Stellen auf Blüten u. Dolden. Fast immer nur einzeln A, G

Strangalia attenuata (L.)

Umg. Auerbach (21) 8. 1974 Einzelfund HA

Saphanus piceus (LAICH.)

Deggendorf (15) am 6. 1953, Auerbach (21) am 6. 1953, Grafenau (18) 7. 1956 Einzelfunde W / Rusel (15) ein Ex. am 8. 1970 D / Umg. Spiegelau (17) ein Pärchen am Boden kriechend G, und am 6. 1979 u. 9. 1982 je ein Ex. A / Umg. Gr. Falkenstein (5, 6, 11) im Juni 1974, 77 u. 85 Einzelfunde LA

Cerambyx scopolii FÜSSL.

Jochenstein (42) am 5. 1985 mehrere Ex. an blühenden Stauden G, A

Obrium brunneum (F.)

Im ganzen Gebiet, auf Blüten u. blühendem Gebüsch stellenweise sehr häufig

Molorchus minor (L.)

Im ganzen Gebiet auf Holz und Blüten, zum Teil sehr häufig

Molorchus umbellatarum (SCHREIB.)

Wegscheid (40) 6. 1972 W / Spiegelau (17) von 1977–1983 im Sommer in meinem Garten regelmäßig auf blühendem Geißbart G, A Waldhäuser (12) 6. 1983 A Einzelfund / Teisnach (4) 8. 1984 LA

Stenopterus rufus (L.)

Passau (37) Kittel 1883 / Grafenau (18) Einzelfund am 7. 1972 W / Jochenstein (42) 6. 1982 Einzelfund A

Aromia moschata (L.)

Deggendorf (15) 7. 1968 Einzelfund HA / Frauenau (11) 8. 1958 ebenfalls Einzelfund LA

Hylotrupes bayulus (L.)

Grafenau (18) 8. 1960 Einzelfund W / Deggendorf/Deggenau (21) in den Jahren 1968–73 regelmäßig aus dem Holz der Haustüre und der Fenster geschlüpft HA

Rhopalpus macropus (GERM.)

Bayer. Wald bei Hauzenstein 1 Ex. 1953, Olga Müller leg.: Gauckler – Nürnberg. i. 1. 1973 – Horion Faunistik Bd. XII

Callidium coriaceum (PAYK.)

Umg. Gr. Falkenstein (6) am 8. 1987 3 Ex. auf einem Holzstoß sitzend LA

Callidium vioaceum (L.)

Im ganzen Gebiet auf Holzplätzen oder Brennholz nicht selten

Phymatodes testaceum (L.)

Ebenfalls überall vorkommend, an eingetragenen Brennholz manchmal massenhaft

Clytus arietis (L.)

Von Mai–August auf blühendem Gebüsch und Holzplätzen im ganzen Gebiet nicht selten

Clytus lama Muls.

Umg. Gr. Falkenstein (6) Einzelfunde am 7. 1982 u. 83 LA / Spiegelau (17) 6. 1982, Waldhäuser (12) 6. 1983, Ruderting (31) 6. 1985 und Jochenstein (42) 7. 1985 alles Einzelfunde A

Plagionotus arcuatus (L.)

Zwieseler Waldhaus (6) Einzelfund am 6. 1956 W / Umg. Hengersberg (21) 6. 1973 in Anzahl auf liegenden Eichen laufend HA

Anaglyptus mysticus (L.)

Umg. Spiegelau (17, 18) in den Sommermonaten mehr oder weniger regelmäßig auf blühendem Gebüsch, aber immer einzeln G, A, LA

Lamia textor (L.)

Grafenau (18) 7. 1952, und Passau (37) 7. 1969, Einzelfunde W / Zwiesel (6) 5. 1960, und Frauenau (11) 7. 1974, Einzelfunde LA / Umg. Deggendorf (21) Einzelfund am 6. 1970 HA / Spiegelau (17) 6. 1976 ebenfalls Einzelfund G

Monochamus sartor (F.)

Gr. Rachel (12) 1906, THIEM

Monochamus sutor (L.)

Grafenau (18) Einzelfund am 7. 1971 W / Spiegelau (17) am 8. 1971 Einzelfund A / Umg. Gr. Falkenstein (5) 6. 1981, Umg. Zwiesel (6) 10. 1980, Oberfrauenau (11) 8. 1987 in großen Mengen auf frischen Holzstößen LA

Mesosa curculionides (L.)

Passau (37) 1883 KITTEL

Anaesthetis testacea (F.)

Jochensteiner Hänge (42) ein Stück am 7. 1986 von Gebüsch geklopft G

Pogonocherus hispidulus (L.)

Umg. Passau (38) 7. 1981 Einzelfund LA

Pogonocherus hispidus (L.)

Grafenau (18) 5. 1956 Einzelfund W / Brandten (5) 4. 1976 Rehmeier leg., in Coll. GEISS

Pogonocherus fasciculatus (DEG.)

Grafenau (18) 9. 1949 W / Frauenau (11) 8. 1960 und Zwiesel (5) 3. 1986 je ein Einzelfund LA / Umg. Deggendorf (21) 8. 1975 Einzelfund HA / Spiegelau (17) am 8. u. 9. 1980 n meinem Keller in Anzahl aus Brennholz geschlüpft. G

Acanthoderes clavipes (SCHRK.)

Passau (37) 1883, KITTEL

Leiopus nebulosus (L.)

Frauenau (11) 6. 1958 Einzelfund LA / Erlau (38) 6. 1983 ebenfalls Einzelfund LA / Klingbrunn (11) 6. 1972 im Flug gefangen G / Spiegelau (17) am 7. 1982 aus eingetragenen Brennholz in Anzahl geschlüpft G / In Jochenstein (42) ein Ex. an einem verpilzten Buchenast G

Acanthocinus reticulatus (RAZM.)

Passau (37) 1883 KITTEL / Zwieseler Waldhaus (6) 10. 1977 ein Einzelfund A

Agapanthia villosoviridescens (DEG.)

Überall im Gebiet mit wechselnder Häufigkeit vorkommend

Agapanthia violacea (F.)

Spiegelau (17) ein Einzelfund am 6. 1973 A / Umg. Gr. Falkenstein (6) am 6. 1982 Einzelfund LA

Saperda carcharias (L.)

Grafenau (18) 5. 1948 Einzelfund W / Frauenau (11) am 6. 1965 und Gr. Falkenstein (6) 9. 1970 Einzelfunde LA / Umg. Deggendorf (21) am 9. 1973 ein Ex. im Fluge gefangen HA / Spiegelau (17) am 7. u. 9. 1977 je ein Ex. G, A / Schaufling, Rusel (15) 8. 1977 HE, D / Oberkreuzberg (17) ein Ex. am 10. 1984 zugeflogen A

Saperda similis LAICH.

Grafenau (18) Einzelfund am 5. 1950 W

Saperda populnea (L.)

Zwiesel (6) 6. 1956 LA / Kötzing (3) am 6. 1958 und in Grafenau (18) am 7. 1958 Einzelfunde W / Jochenstein (42) am 6. 1984 ein Ex. von Gebüsch geklopft A / Spiegelau (17) in einem kleinen Zitterpappelbestand finde ich in den Sommermonaten regelmäßig die Tiere G

Saperda scalaris (L.)

Spiegelau (17) am 6. u. 7. 1982 in mehreren Exemplaren in meinem Holzkeller aus Brennholz geschlüpft G / Umg. Gr. Falkenstein (6), Frauenau (10), Zwiesel (11) am 6. 1982 LA

Saperda octopunctata (SCOP.)

Passau (37) 1883 KITTEL

Oberea erythrocephala (SCHRANK.)

Passau (37) 1883 KITTEL / Grafenau (18) Einzelfund am 7. 1962 W

Oberea pupillata (GYLL.)

Passau (37) 1883 KITTEL

Oberea ocolata (L.)

Grafenau (18) Einzelfunde am 7. 1951, 54 und 1969 W / Rusel (15) 7. 1970 D / Umg. Gr. Falkenstein (3, 6) nur vereinzelt LA / Umg. Spiegelau (17, 18) von 1973–1976 nur einzelne Funde G, A

Oberea linearis (L.)

Umg. Deggendorf (21) ein Einzelfund am 7. 1972 HA / Spiegelau (17) am 6. 1973 konnte ich zwei Ex. von einer Haselstaude klopfen, trotz intensiver Suche in den folgenden Jahren keine Funde mehr. G

Stenostola ferrea (SCHRANK.)

Von THIEM 1906 Umg. Rachel gefangen (12)

Phytoecia nigricornis (F.)

Umg. Deggen Dorf (21) am 5. 1969 ein Einzelfund HA / Jochensteiner Hänge (42) am 6. 1984 G, und am 8. 1985 A, Einzelfunde, die Tiere wurden vom Gras gestreift / Spiegelau (17) Einzelfunde am 5. u. 6. 1984 A

Phytoecia cylindrica (L.)

Spiegelau (17, 18) von 1973–1980 vereinzelt mit dem Käscher gestreift G, A / Umg. Lalling (16) 7. 1983 Einzelfund A / Umg. Deggen Dorf (21) 5. 1970 HA

Tetrops praeusta (L.)

Umg. Deggen Dorf (21) 6. 1969 HA / Spiegelau (17) am 5. 1975, und Jochenstein (42) 6. 1985 von Gebüsch geklopft G / Kirchdorf v. Wald (17) ein Ex. am 5. 1976 A / Umg. Zwiesel (5, 6, 11) in den Jahren 1982–85 vereinzelt LA

Zusammenfassung

Für das ausgewiesene Gebiet konnten 91 Arten nachgewiesen werden, wobei einige Funde lange zurückliegen (KITTEL 1883 und THIEM 1906).

Literatur

- HARDE, K. W. 1966: 87. Fam.: Cerambycidae. In: FREUDE, HARDE, LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas Bd. 9, Krefeld.
- BUCK, R. 1982: Die Bockkäfer des Bamberger Umlandes. – LVII. Bericht Natuf. Gesellschaft Bamberg, 286–302.
- HORION, A. 1951: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. – Bd. II, Stuttgart.
- HORION, A. 1974: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Bd. XII: Überlingen – Bodensee
- KITTEL 1873–1884: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. – Correspondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereins Regensburg 27 (9), 9–192.
- KLAUSNITZER, B. 1981: Die Bockkäfer Mitteleuropas. – Wittenberg Lutherstadt.
- KUHNT, P. 1911: Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. – S. 751–800, Stuttgart.
- THIEM, M. 1906: Biographische Beobachtungen des Rachel. – Abhandlung der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg 16.

Anschrift des Verfassers
Günther GEISS
Angerweg 2, Langdorf, 8356 Spiegelau